

FLEBOSMINA®
HIDROSMINA
Gel
Industria Argentina
Venta bajo receta

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Fórmula: Cada 100 g de gel contiene: Hidrosmina: 2,000 g; Carbomero: 0,750 g; Trietanolamina: 0,900 g; Metilparabeno: 0,100 g; Propilparabeno: 0,050 g; Agua purificada c.s.p.: 100,000 g.

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar este medicamento, porque contiene información importante para usted.

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico o farmacéutico.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita consejo o más información, consulte a su farmacéutico.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.
- Debe consultar a un médico si empeora o no mejora después de 5 ó 6 días.

Contenido del prospecto:

1. Qué es FLEBOSMINA gel y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a usar FLEBOSMINA gel
3. Cómo usar FLEBOSMINA gel
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de FLEBOSMINA gel
6. Contenido del envase e información adicional

1. Qué es FLEBOSMINA gel y para qué se utiliza

FLEBOSMINA es un medicamento venotónico: aumenta el tono de las venas y la resistencia de los capilares (pequeños vasos sanguíneos). FLEBOSMINA está indicado en adultos para el alivio de los síntomas relacionados con la insuficiencia venosa leve de las extremidades inferiores, tales como dolor, sensación de pesadez, tirantez, hormigueo y picor en piernas con varices o piernas hinchadas.

Debe consultar a un médico si empeora o si no mejora después de 5 ó 6 días.

2. Qué necesita saber antes de empezar a usar FLEBOSMINA gel

No use FLEBOSMINA gel

- si es alérgico a hidrosmina o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento.
- en afecciones de la piel, tales como dermatitis, eczemas o urticarias.
- sobre mucosas, ni zonas de la piel irritadas o heridas.

Advertencias y precauciones

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a usar FLEBOSMINA gel.

- usar solo sobre la piel intacta.
- evite el contacto con los ojos y mucosas, el oído y la boca.
- no aplicar simultáneamente en la misma zona que otros medicamentos de uso cutáneo.
- reacciones alérgicas locales debida a los excipientes.
- no utilizar de forma prolongada sin control médico.

Niños y adolescentes

- no se debe utilizar en niños.

Uso de FLEBOSMINA gel con otros medicamentos: Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado recientemente o podría tener que utilizar cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta médica.

No se conocen interacciones con los alimentos ni con otros medicamentos, en todo caso nunca debe usar otro medicamento por iniciativa propia sin que se lo haya recomendado su médico.

No aplicar simultáneamente en la misma zona que otros medicamentos de uso cutáneo.

Embarazo y lactancia: Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

No se dispone de datos clínicos con FLEBOSMINA relativos al uso de hidrosmina en mujeres embarazadas. Como medida de precaución, no se recomienda el uso de FLEBOSMINA durante el embarazo, a no ser que a criterio del médico, considere que los beneficios potenciales de su administración superan los posibles riesgos.

No se dispone de datos clínicos relativos al uso de hidrosmina en mujeres en periodo de lactancia. Se desconoce si hidrosmina se excreta por leche materna, por lo que no se recomienda su uso durante la lactancia.

Conducción y uso de máquinas: La influencia de FLEBOSMINA sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante.

3. Cómo usar FLEBOSMINA gel

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico o farmacéutico. En caso de duda, consulte a su médico o farmacéutico.

Si los síntomas no mejoran en 5-6 días, debe suspender el tratamiento y acudir al médico.

Adultos: La dosis recomendada es: 3-4 centímetros de gel 2 ó 3 veces al día si fuera necesario.

Instrucciones para la correcta administración del preparado

Uso exclusivamente cutáneo sobre piel intacta.

Extender sobre la zona afectada, aproximadamente 3-4 cm de gel, según necesidad, 2 ó 3 veces al día realizando un pequeño masaje para favorecer la absorción del producto.

Se deben lavar las manos después de cada aplicación a fin de evitar un contacto involuntario con ojos y mucosas.

Si empeora, no mejora o se produce irritación en la zona tratada, deberá consultar al médico.

Si olvidó usar FLEBOSMINA gel

No aplique una dosis doble para compensar las dosis olvidadas. Aplíquelo tan pronto como lo recuerde y prosiga con la pauta habitual.

4. Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Durante el periodo de utilización de FLEBOSMINA gel se han producido algunos efectos adversos cuya frecuencia no se ha podido determinar con exactitud:

- Reacciones de hipersensibilidad (alérgicas) a hidrosmina o a alguno de los excipientes.
 - Erupción y picor en la piel en la zona de aplicación.
- Estas reacciones desaparecen cuando se interrumpe el tratamiento.

5. Conservación de FLEBOSMINA gel

Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar a temperatura inferior a los 25°C y evitar de mantener a temperaturas superiores.

6. Presentaciones:

Envases conteniendo 40 g de gel.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N° 54.525



Dr. LAZAR y Cia. S.A.Q. e I.
Av. Vélez Sársfield 5853/5855
B1605EPI Munro, Pcia. De Buenos Aires
Directora Técnica: Daniela A. Casas,
Farmacéutica y Bioquímica.

**36779/2
P309**